

## 1. TD

**Exercice 1** (Matrices de permutation et décomposition *LUP*). On appelle matrice de permutation  $P_\sigma$  associée à la permutation  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$  la matrice définie par

$$(P_\sigma)_{ij} = \delta_{i,\sigma(j)} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = \sigma(j), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Si la permutation  $\sigma$  est une transposition, alors on parle de matrice de transposition.

1. Soit  $P$  une matrice de permutation. Montrer que  $P$  est inversible et donner son inverse.
2. Soit  $P$  et  $Q$  deux matrices de permutation de même taille. Montrer que le produit  $PQ$  est une matrice de permutation que vous exhiberez.
3. Soit  $P$  une matrice de permutation de taille  $n \times n$ . Montrer que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$$

est une matrice de permutation de taille  $(n+1) \times (n+1)$ .

Soit  $A$  une matrice inversible de taille  $n \times n$ . La réduction de Gauss peut être vue de manière récursive en considérant successivement des matrices de taille décrétementée. Soit  $P$  la matrice de transposition (échangeant la ligne 1 avec la ligne  $k$ ) qui, une fois appliquée à  $A$ , fait que le premier pivot soit non nul. Alors nous avons la première réduction de Gauss :

$$PA = \begin{pmatrix} a_{k,1} & l \\ c & (PA)_{1,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c/a_{k,1} & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{k,1} & l \\ 0 & (PA)_{1,1} - c \cdot l/a_{k,1} \end{pmatrix}$$

où  $c$  et  $l$  sont, respectivement, la première colonne et la première ligne de  $PA$  privées de leur élément commun,  $(PA)_{1,1}$  représentant la sous matrice de  $PA$  restant. La réduction totale de  $A$  est alors obtenue en appliquant récursivement cette formule sur la matrice  $A' = (PA)_{1,1} - c \cdot l/a_{k,1}$  de taille  $(n-1) \times (n-1)$ .

4. Montrer par récurrence sur  $n$  que toute matrice  $A$  inversible de taille  $n \times n$  admet une décomposition de la forme

$$PA = LU$$

où  $P$  est une matrice de permutation,  $L$  est une matrice triangulaire inférieure et  $U$  une matrice triangulaire supérieure.

Indication : considérer le produit de matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c/a_{k,1} & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{k,1} & l \\ 0 & (PA)_{1,1} - c \cdot l/a_{k,1} \end{pmatrix}$$

où  $P'$  est une matrice de permutation de taille  $(n-1) \times (n-1)$ .

5. En déduire un algorithme qui décompose en place une matrice inversible  $A$  de taille  $n \times n$  sous sa forme  $LU$  (en utilisant la stratégie du pivot partiel) et renvoie la matrice de permutation  $P$  correspondant sous la forme d'un vecteur  $s$  d'entiers de taille  $n$ .

6. Soit  $A$  et  $B$  deux matrices carrées de même taille. Montrer que

$$A^T B^T = (BA)^T$$

7. Dédurre de la question précédente qu'une matrice  $A$  inversible peut être décomposée sous la forme

$$A = LUP$$

où  $L$  est une matrice triangulaire inférieure,  $U$  une matrice triangulaire supérieure et  $P$  une matrice de permutation.

**Exercice 2** (Résolution d'un système linéaire). Résoudre le système à coefficients dans  $\mathbb{Q}$  suivant en utilisant une décomposition  $LUP$ .

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 \\ 6 & 13 & 5 & 19 \\ 2 & 19 & 10 & 23 \\ 4 & 10 & 11 & 31 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

**Exercice 3** (Calcul de déterminant). Le déterminant d'une matrice carrée  $A$  de taille  $n \times n$  est un invariant très important car il permet d'obtenir beaucoup d'informations sur la nature de  $A$ . Soit  $\sigma$  une permutation de  $S_n$ , on appelle signature de  $\sigma$ , notée  $\epsilon(\sigma)$ , l'entier  $(-1)^k$  où  $k$  est le nombre de couple  $(i, j)$  vérifiant  $i < j$  et  $\sigma(i) > \sigma(j)$ . Le déterminant de  $A = (a_{i,j})$ , noté  $\det(A)$ , est défini de la manière suivante

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

Notez que la complexité de cette formule est telle qu'il ne faut absolument pas l'utiliser en pratique !

1. Soit  $A$  et  $B$  deux matrices carrées de même taille. Montrer que  $\det(A^T) = \det(A)$ . On peut aussi montrer que  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
2. En utilisant une décomposition  $LUP$  d'une matrice carrée, donner une formule permettant de calculer le déterminant à l'aide (uniquement) des *pivots* et du *nombre de matrices de transposition* composant  $P$ .
3. Dédurre de la question précédente une majoration de la complexité du calcul du déterminant d'une matrice carrée de taille  $n \times n$ .

## 2. TME

**Exercice 4** (Un ordinateur compte mal!). Que doit normalement afficher le programme suivant ?

```
format long e;
x = 4;
for i=1:100
    x=sqrt(x);
end
for i=1:100
    x = x^2;
end
disp(x);
```

Exécuter le programme sur l'ordinateur. Quel est le résultat affiché ? Expliquez.

**Exercice 5** (Utilisation des BLAS). **1.** Soit  $A$  une matrice de taille  $m \times n$ . Écrire un programme MATLAB « orienté colonne » calculant

$$s_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

pour  $i = 1, 2, \dots, m$ . Utiliser ensuite les BLAS (via la commande `norm`) pour calculer les  $s_i$ . Comparer l'efficacité de ces deux algorithmes.

**2.** Étant données 2 matrices  $A$  et  $B$  de taille  $n \times n$ . Écrire un programme qui calcule  $AB$ . Comparer l'efficacité de votre programme avec la commande `A*B`.

**Exercice 6** (Implantation de la décomposition LU). **1.** Implanter la décomposition  $LUP$  d'une matrice carrée en utilisant la stratégie du pivot partiel.

**2.** Tester votre implantation sur des exemples concrets.

**3.** Comparer votre implantation avec celle de MATLAB (commande `lu`)

**Remarque :** pour les mesures de temps, vous utiliserez les commandes `tic` et `toc` de MATLAB :

```
tic;  
programme;  
toc
```